



## Przygotowanie do badania biopsja cienkoigłowej tarczycy:

- Tydzień przed planowanym terminem badania nie powinno się przyjmować preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna, Polopiryna), ibuprofen, naproksen i inne tzw. „przeciwbólowe” – chyba, że lekarz zaleci inaczej.
- Jeśli pacjent stosuje leki przeciwzakrzepowe (np. Acenokumarol, Sintrom, Warfin i inne) należy koniecznie poinformować o tym lekarza zlecającego badanie. Lekarz zaleci ich odstawienie w odpowiednim czasie przed badaniem.
- W razie wątpliwości, czy leki, które są przyjmowane mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonania badania można zapytać o to lekarza kierującego.
- Kilka godzin przed badaniem powstrzymać się od jedzenia i picia.

## Zalecenia po badaniu

- Powrócić do normalnej diety.
- W ciągu 24 godzin od badania powstrzymać się od nadmiernej aktywności fizycznej.
- Przez 48 godzin nie powinno się przyjmować preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna, Polopiryna), ibuprofen, naproksen i inne tzw. „przeciwbólowe” – chyba, że lekarz zaleci inaczej. Dopuszczalny jest paracetamol.

Po badaniu można odczuwać dyskomfort, zasinienie czy niewielkie krwawienie w miejscu pobrania. Zazwyczaj dolegliwości bólowe w związku z biopsją są znikome i większość pacjentów nie potrzebuje leków przeciwbólowych po badaniu.