



Przygotowanie do badania:

Przed wykonaniem testów skórnych wymagana jest:

- ocena medyczna aktualnego stanu zdrowia pacjenta
- odstawienie leków przeciwhistaminowych o przedłużonym działaniu (hismanal, zaditen, intal i tilade) na co najmniej dwa tygodnie przed badaniem
- odstawienie na co najmniej 48 godzin leków przeciwhistaminowych (clemastin, diphergan, hydroxyzyna, phenazolina, zyrtec, clarityna, fenistil, preparatów wapnia i kortykosterydów).

Po wykonaniu badania:

- należy unikać ekspozycji na alergen
- należy unikać znacznych wysiłków fizycznych.
- z uwagi na możliwość wystąpienia reakcji niepożądaney, chory powinien pozostawać pod obserwacją lekarza bezpośrednio po wykonaniu badania.

Wskazania:

- ustalenie alergenu odpowiedzialnego za objawy alergii (katar sienny, zmiany atopowe skóry, alergia pokarmowa)
- ustalenie właściwego alergenu, celem zastosowania leczenia odczulającego

Przeciwwskazania

- zaostrzona choroba alergiczna
- zaostrzona choroba infekcyjna
- przewlekła choroba układowa (np.: choroba nowotworowa, choroby układowe - kolagenozy)
- działanie kortykosterydów o przedłużonym działaniu